

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

1802-AHI-YK

ひざ、腰、肩の痛みに塗って効く

# 新トリナートハイ

## 温感タイプ

第3類医薬品

〈外用鎮痛消炎薬〉

### 特 徴

新トリナートハイ温感タイプは、浸透性に優れたクリーム基剤を使用した温感タイプの軟膏ですので、効きめの成分が速やかに皮膚に浸透、吸収され、優れた鎮痛・消炎効果をあらわします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

○ 腰痛、肩こり、捻挫、筋肉痛、打撲、骨折痛、関節痛、筋肉疲労、しもやけ



日本薬師堂

## 用法・用量

1日2～3回適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 成分・分量

100g中

l-メントール	5.0g	サリチル酸メチル	6.0g
dL-カンフル	3.0g	ジフェンヒドラミン	0.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	トウガラシエキス	0.1g

(原生薬5gに相当)

※添加物として、流動パラフィン、プロピレングリコール、セタノール、サラシミツロウ、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸グリセリン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、パラフィン、ステアリン酸ポリオキシシル、ジメチルポリシロキサン、ユーカリ油、キサンタンガム、パラベンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11

株式会社 日本薬師堂

☎0120-894-894 8:00～21:00(年中無休)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

株式会社 **日本薬師堂**

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11

製造販売元

株式会社 **雪の元 本店**

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

®登録商標

