

*2018年1月改訂

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第3類医薬品

生薬製剤

キノウケア

⚠️ • 使用上の注意 •

* してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

- (1) 次の診断を受けた人
認知症
- (2) 認知症の疑いのある人



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
* 精神神経系	めまい

- *3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- *5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

もっともっと健康に



日本薬師堂

NIHON YAKUSHIDO

●効能・効果●

中年期以降の物忘れの改善

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

用法・用量を厳守してください。

●成分・分量●

本品3包(3.6g)

オンジ..... 3g

上記より製したオンジエキス1.3gを含有する顆粒剤です。添加物としてデキストリン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、乳糖を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます
株式会社日本薬師堂
東京都渋谷区渋谷3-27-11
0120-894-894 8:00～21:00(年中無休)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎0120-149-931(フリーダイヤル)